



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

Αρ. Πρωτοκόλλου :	Έκδοση 2 ^η	Ιούλιος 2014	Σελίδα 1 από 4
-------------------	-----------------------	--------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

**ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
FISTULA - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ**

Συντάχθηκε από :	Νούλας Ιωάννης Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κορδά Παρασκευή
Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα	Γαλάτου Νίκη
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Παπούλια Ευθυμία
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Αμφισσας	Δάρρας Σταμάτιος
Απόφαση Δ. Σ. : Συνεδρίαση 17 ^η της 19/9/2014 Θέμα 6 ^ο	

ΥΛΙΚΑ

Αποστειρωμένο set φλεβοκέντησης

τετράγωνο αδιάβροχο, γάζες για την αντισηψία,
τολύπια αιμόστασης-αυτοκόλλητα στήριξης βελονών,
αυτοκόλλητα επιθέματα ,πίεστρα αιμόστασης

Αντισηπτικά διαλύματα

Ιωδιούχος ποβιδόνη 10%,οινόπνευμα

Βελόνες παρακέντησης

15G, 16G, 17G

Σύριγγες 10cc

Φιαλίδιο ηπαρίνης

**Συριγγοφύσιγγα ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους**

Φιαλίδια φυσιολογικού ορού 10cc

Λαβίδες ,ταινία ελαστικής περίδεσης νεφροειδή

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Πλύσιμο χεριών	Πρόληψη λοιμώξεων
Παρατήρηση(αιμάτωμα, οίδημα, φλεγμονή) Ψηλάφηση(επώδυνη, θερμή, σημεία στένωσης) Ακρόαση (ροίζος' διαφοροποίηση φυσήματος)	Αξιολόγηση της fistula- Μοσχεύματος Ενημέρωση των Ιατρών
Επιλογή σημείου παρακέντησης	Για αποφυγή επιπλοκών
Επιλογή τεχνικής παρακέντησης (τύπου "κουμπότρυπα", τύπου "ανεμόσκαλα", ανά περιοχή)	Η αλλαγή σημείου παρακέντη- σης συμβάλει στη μακροβιότη- τα του αγγείου
Καθαρισμός του δέρματος με αντισηπτικό εφαρμόζοντας κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς τη περιφέρεια	Με τη τεχνική αυτή εξασφαλί- ζεται σωστή αντισηψία
Άνοιγμα του set παρακέντησης , των βελονών, των συριγ- γών -εφαρμογή γαντιών –τοποθέτηση αποστειρωμένου τε- τραγώνου – πλήρωση του αυλού των βελονών με ηπα- ρινισμένο φυσιολογικό ορρό – κλείσιμο του κλείστρου των βελονών	Με τη τεχνική αυτή εξασφαλί- ζεται σωστή προετοιμασία παρακέντησης
Εφαρμογή ελαφράς περίδεσης, αφαίρεση του καλύματος της βελόνας με άσηπτες συνθήκες, εισαγωγή της βελόνας στο δέρμα υπό γωνία 20-35° , προώθηση της βελόνας εως τα 2/3 του μήκους της	Σωστή τεχνική (περίδεση μόνο στη fistula)
Έλεγχος για διαπίστωση επαρκούς ροής αίματος, αν όχι κατάλληλοι χειρισμοί για την εξασφάλιση της	Για την εκτέλεση της αιμοκά- θαρσης
Ακινητοποίηση των βελονών	Πρόληψη μετακίνησης τους ή Εξόδου τους
Σύνδεση των βελονών με τα αντίστοιχα σκέλη των γραμμών αιμοκάθαρσης	Έναρξη συνεδρίας



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

1. « Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών»
Πρωτόκολλα Νοσηλευτικής Νεφρολογικής Πρακτικής
Υπό την αιγίδα της ΕΣΝΕ ,(Αθήνα 2003.)
2. Πρακτικά 11^{ης} Νοσηλευτικής Ημερίδας ,(Αθήνα 2001.)
- 3.Πρακτικά του 6^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσηλευτών Νεφρολογίας (2004) .

