

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ



Α. Κυριακίδης, Η. Αλεξανδρής, Ε. Παναγιωτίδη,
Κ. Αθανασίου, Η. Οικονόμου, Χ. Ζαφειρίου.
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

Η συνεχής αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού, έχει συχνά σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι υπερήλικες να χρειάζονται τις φροντίδες χειρουργού και αναισθησιολόγου για την αντιμετώπιση οξέων χειρουργικών παθήσεων παχέος εντέρου και ορθού

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

ΥΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (1)

Στην ομάδα μας συμπεριλάβαμε 13 ασθενείς (5άνδρες, 8γυναίκες) ηλικίας άνω των 90 ετών, από 90 έως 94 έτη οι οποίοι χειρουργήθηκαν στην κλινική μας λόγω οξέων χειρουργικών παθήσεων παχέος εντέρου και ορθού τον τελευταίο χρόνο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

ΥΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (2)

9 ασθενείς παρουσίασαν ειλεό, 6 λόγω Ca σιγμοειδούς, 1 ασθενής Ca ανιόν κόλου, 1 ασθενής λόγω Ca ορθού, 1 ασθενής Ca κατιόν κόλου . 2 ασθενείς είχαν ρήξη τυφλού λόγω κοπρόστασης, 1 ασθενής- ρήξη εκκολπώματος σιγμοειδούς και 1 ασθενής –νέκρωση σιγμοειδούς.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

ΥΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ (3)

Το είδος της αναισθησίας που επιλέχτηκε ήταν συνδυασμένη επισκληρίδιος και ραχιαία καθώς και γενική και ραχιαία/επισκληρίδιο σε λίγες (3) περιπτώσεις χορηγώντας όμως μικρές δόσεις μυοχαλαρωτικών φαρμάκων.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

Πραγματοποιήθηκαν 8 επεμβάσεις Hartmann, 2 τυφλοστομίες συνδυασμένες με loop-σιγμοειδοστομίες, 1 ΔΕ ημικολεκτομή και 2 παρηγορητικές κολοστομίες. Η διεγχειρητική θνησιμότητα ήταν 0%.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)

Επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 6 ασθενείς (49,2%).
Πνευμονική ατελεκτασία σε 3 ασθενείς, λοίμωξη αναπνευστικού σε 1 ασθενή, διαπύηση του τραύματος σε 2 ασθενείς. Μέσος όρος νοσηλείας ήταν 9,5 ημέρες. Δύο ασθενείς απεβίωσαν λόγω σηπτικής καταπληξίας και ένας ασθενής λόγω πνευμονικής εμβολής (θνητότητα 24%)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ

Συμπεράσματα :

Επείγουσα χειρουργική παρέμβαση σε υπερήλικα άνω των 90 χρονών για παθήσεις παχέος εντέρου πρέπει να γίνει στο πρώτο 24 ώρο, να είναι όσο λιγότερα επιβαρυντική για τον ασθενή και να προσφέρει όσο είναι εφικτό την ριζική λύση στο πρόβλημά του. Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή του είδους της αναισθησίας όπου η γενική νάρκωση πρέπει να αποφεύγεται.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

