



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


5^η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου :	Έκδοση 1 ^η	Οκτώβριος 2014	Σελίδα 1 από 4
-------------------	-----------------------	----------------	----------------

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ**

Συντάχθηκε από :	Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος: Καραλή Μαρία Νοσηλεύτριες ΤΕ: 1.Γούλα Αγγελική 2.Γρηγοροπούλου Ασημίνα Νοσηλεύτρια ΔΕ: Σαμπάνη Γεωργία
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κορδά Παρασκευή
Τομέαρχης Χειρουργικού Τομέα	Γαλάτου Νίκη
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Παπούλια Ευθυμία
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Αμφισσας	Δάρρας Σταμάτιος
Απόφαση Δ.Σ. : Συνεδρίαση 26 ^η της 18/12/2014, Θέμα 14 ^ο	




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ	ΟΡΙΣΜΟΣ
Στάδιο 1ο	Ερύθημα δέρματος που δεν υποχωρεί παρά την άρση της πίεσης για περισσότερο από 20-30'
Στάδιο 2ο	Δερματική βλάβη μερικού πάχους που περιλαμβάνει την επιδερμίδα, το δέρμα ή και τα δύο. Το έλκος παρουσιάζεται κλινικά ως εκδορά ή φλύκταινα.
Στάδιο 3ο	Βλάβη ολικού πάχους δέρματος ή καταστροφή ή και νέκρωση του υποδόριου ιστού.
Στάδιο 4ο	Εκτενής καταστροφή ιστών, με βλάβη στους μύες ή τένοντες ή οστά.
Νεκρωτική εσχάρα.	Σε περίπτωση που υπάρχει εσχάρα στη κατάκλιση ,σταδιοποίηση γίνεται αφού αφαιρεθεί η εσχάρα.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαφανή	Έλκος σταδίου II, προστασία από τριβή.
Υδροκολλοειδή	Έλκος με χαμηλή έως μέτρια ποσότητα εξιδρώματος.
Αφρώδη υδροπολυμερή	Έλκος με μέτρια έως μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος .
Υδρογέλες	Έλκος με νεκρωτικό ιστό.
Αλγινικά	Έλκος με κοιλότητα και εικόνα λοίμωξης.
Επιθέματα αργύρου	Έλκος με εικόνα λοίμωξης
Υδροτριχοειδικά	Έλκος με χαμηλή έως μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος, σε όλες τις φάσεις επούλωσης.



Υλικά:

- Γάντια
- Αποστειρωμένες γάζες
- Νεφροειδές
- Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%)
- Τετράγωνο αδιάβροχο
- Κατάλληλα επιθέματα.

Νοσηλευτικές πράξεις.	Αιτιολογήσεις.
ΣΤΑΔΙΟ 1(ερυθρότητα δέρματος) 1.Εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αποφυγή δημιουργίας έλκους κατάκλισης.	Πρόληψη λύσης συνέχειας του δέρματος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος.
ΣΤΑΔΙΟ 2(εκδορά ή φλύκταινα) 1.Καθαρισμός έλκους με άφθονο φυσιολογικό ορό NaCl 0,9%.Απαγορεύονται τα αντισηπτικά ή τοπικά αντιβιοτικά. 2.Σκούπισμα με αποστειρωμένη γάζα περιμετρικά του έλκους, ταμποναριστά. 3.Τοποθέτηση διαφανούς επιθέματος	Πρόληψη επέκτασης ιστικής καταστροφής και θεραπεία εξέλκωσης.
ΣΤΑΔΙΟ 3(νέκρωση υποδόριου ιστού) 1.Εφαρμογή όλων των ενεργειών του 2 ^{ου} σταδίου. 2.Τοποθέτηση υδροπολυμερούς επιθέματος.	Θεραπεία και επούλωση της εξέλκωσης.
ΣΤΑΔΙΟ 4(εκτενής καταστροφή ιστών, μυών, οστών) 1.Εφαρμογή όλων των ενεργειών του 3 ^{ου} σταδίου. 2.Ιατρική παρακολούθηση και χορήγηση αντιβιοτικών συστηματικά για συμπτώματα της μικροβιαμίας . 3.Χειρουργικός καθαρισμός σε προβληματικές καταστάσεις. 4.Χρήση υδρογέλης ,αλγινικού (κορδόνι) και υδροτριχοειδικού επιθέματος.	Αφαίρεση νεκρωμάτων και περιποίηση έλκους. Πρόληψη επιμόλυνσης τραύματος.

<p>ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ.</p> <p>1.Χειρουργικός καθαρισμός.</p> <p>2.Εφαρμογή υδρογέλης, αλγινικού επιθέματος αργύρου και υδροτριχοειδικού επιθέματος.</p>	<p>Αφαίρεση νεκρωμάτων, περιποίηση περιοχής έλκους. Πρόληψη επιμόλυνσης τραύματος.</p>
--	--

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

- Χαρχαρίδου Μαρία (2009) Πρόληψη, σταδιοποίηση και αντιμετώπιση κατακλίσεων.



